



Presentación

Formato	Uds. / embalaje	kg-l / Palet
250 ml	20	315
1 L	12	480

Características / Modo de acción	Composición	Formulación	Recomendaciones de uso
Plazo de seguridad y LMRs	Preparación del caldo	Registro y clasificación	

Recomendaciones de uso

CULTIVO	PLAGA	TIPO DE APLICACIÓN	DOSIS RECOMENDADA
Ajo	Roya y alternaria	Pulverización foliar normal.	300-500 cc/ha, 3-4 aplicaciones, intervalos de 7-14 días
Apio	Septoria		300-500 cc/ha, 4 aplicaciones, intervalos de 7-14 días
Ciruelo	Oídio		20-30 cc/100 l de agua, 3 aplicaciones preventivas con intervalos de 7 a 21 días entre el hinchado de yemas hasta el endurecimiento del hueso.
Ciruelo y Cerezo	Monilia		20-30 cc/100 l de agua, 3 aplicaciones preventivas cuando se den las condiciones para desarrollo de la enfermedad con un intervalo de 7-14 días, la última aplicación como máximo 7 días antes de la recolección.
Clavel	Roya		300-500 cc/ha, 5 aplicaciones, intervalos de 14 días.
Espárrago	Roya y alternaria		500 cc/ha, 3 aplicaciones, intervalos de 14-21 días.
Lechuga y chirivía	Alternaria		500 -800 cc/ha, 3 aplicaciones, intervalos de 10-14 días.
Manzano y Peral	Moteado		20 cc/100 l de agua, 3-5 aplicaciones, intervalos de 7-10 días, desde hinchado de las yemas hasta que el fruto alcance 1 cm de diámetro; después de este estadio, aplicar a intervalos de 12-18 días.
Peral	Roya y Septoria		20 cc/100 l de agua, 3-5 aplicaciones, intervalos de 14 días. En plantaciones adultas, con volúmenes de caldo inferiores a 1500 l/ha, se aplicará a dosis de 300 cc/ha.
Níspero	Moteado		10-20 cc/100 l de agua, 5 aplicaciones, intervalos de 14-24 días.
Olivo	Repilo (exclusivamente en primavera)		60 cc/ 100 l de agua, 1-2 aplicaciones, intervalos de 14-21 días. En mezcla con productos cúpricos se rebajará la dosis a 10 cc/100 l de agua.
Patata	Alternaria		800 cc/ha, 3-4 aplicaciones, intervalos de 12 días.
Remolacha	Oídio y Cercospora		300-500 cc/ha, 1-3 aplicaciones, intervalos de 3-4 semanas.
Tomate	Alternaria		50-64 cc/100 l de agua (máx. 800 cc/ha). En tomate extensivo, aplicar 500-800 cc/ha. 2-4 aplicaciones, intervalos de 7-10 días.
Melocotonero y Nectarino	Cribado, Monilia en brotes, Oídio y Abolladura		20-30 cc/100 l de agua (máximo 1,5 l/ha). 3 aplicaciones preventivas con intervalos de 7-21 días entre el hinchado de yemas hasta el endurecimiento del hueso. Contra Monilia en brotes 2-3 aplicaciones entre pre y postfloración.
Albaricoquero	Cribado, Monilia en brotes y Oídio	20-30 cc/100 l de agua (máximo 1,5 l/ha). 2-3 aplicaciones entre pre y postfloración, empezar las aplicaciones en corola visible. Intervalo entre aplicaciones de 7 a 14 días.	

Es recomendable comenzar las aplicaciones preventivamente o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

En caso de mezcla con otros productos, recomendamos efectuar un reducido ensayo previo para observar la compatibilidad física y la reacción del cultivo en los días siguientes al ensayo.